Vitatek®

Ficha Técnica

Kain 41

Glifosato Herbicida / Solución acuosa

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO 10.80
INGREDIENTE ACTIVO: Sal isopilamina de glifosato: 2-(fosfonometilamino) acetato con un contenido de glifosato no menor de 74% (Equivalente a 460 g de i.a. /L a 20°C)	41.00
INGREDIENTES INERTES: Diluyente, solubilizante y surfactante	59.00
	100.00

No. de Registro: RSCO-HEDE-0230-X0151-375-41.0

Vitatek

Contacto@vitatek.com.mx

Titular de la marca y distribuidor:
Avenida Santa Fe 596, Int. 1602 Lomas de Santa Fe,
Cuajimalpa de Morelos CDMX, C.P. 05348

USESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y ENFERMEDAD AQUÍ RECOMENDADA"
"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

MODO DE ACCIÓN:
Kain 41 es un herbicida sistémico de amplio espectro que es absorbido por la planta a través de las hojas y de los tallos inmaduros. Controla todo tipo de malezas, incluyendo gramíneas, perennes y leñosas.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Glifosato pertenece grupo de los inhibidores de la EPSPS (Grupo 9 HRAC), la cual es la enzima responsable de la formación de los aminoácidos aromáticos fenilanina, tirosina y triptófano. Al inhibir esta enzima de la vía metabólica, se afectan procesos de la planta como la síntesis de aminoácidos aromáticos, la reducción de la síntesis de proteínas y otras moléculas que llevan a la planta a una muerte celular prematura.

MÉTODO DE PREPARACIÓN:
Agite el envase antes de usar el producto. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de Kain a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

Cultivos	*Plaga / Dosis (L/ha)* Nombre común	*Nombre Científico*	Intervalo de seguridad (días)
Aguacatero, Naranjo, Toronjo, Limonero, Mandarino, (SL)	Zacate Johnson	Sarghum halepense	2-4
	Zacate guinea	Panium máximum	3-4
	Zacate para	Brachiaria mutica	4-6
	Zacate bermuda Coquillo Correhuela Hierba de pollo	Cynodon dactylon Cyperus esculentus Crotundus Convolvulus arvensis Cammelina diffusa	4-8
Plátano (SL)	Zacate peludo Zacate pinto Botón de oro Zacate pata de gallina Dormilona	Rottboellia cochinchinensis Echinochloa colonum Melampodium divaricatum Digitaria sanguinalis Mimosa púdica	4-6
	Escobilla Falsa altamisa Hierba de paloma	Sida acuta Partenium hystepphorus Euphorbia hirta	

CONTRAINDICACIONES:
Cuando haya amenaza de lluvia o esté lloviendo, evite aplicar el producto para evitar el lavado del mismo o que el viento afecte la aplicación.

FITOTOXICIDAD:
Kain 41 no es fitotóxico para los cultivos mencionados, siguiendo las recomendaciones específicas de la etiqueta.