Vitatek®

Ficha Técnica

Fuegotek 200

Glufosinato

Glufosinato de amonio ● Ácidos fosfínicos ● Herbicida

COMPOSICIÓN PORCENTUAL **% EN PESO**

INGREDIENTE ACTIVO:

Glufosinato de amonio:
Ácido de amonio (2RS)-2-amino-4-(metilfosnato)butírico.....20.58 %
(Equivalente a 200 g de i.a./L a 20 ºC)

INGREDIENTES INERTES:

Humectante, agente neutralizante y solvente.....81.6 %
TOTAL.....100.0%

No. de registro: RSCO-HEDE-0231-X0107-375-18.40



Nocivo si se inahala

Vitatek®

Titular de la marca y distribuidor
Vitatek
Avenida Santa Fe 596, Int. 1602
Col. Lomas de Santa Fe, CP. 05348
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. CdMx,
México.

No. de lote:
Fecha de fabricación (AA/MM/DD):
Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fecha de fabricación.

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

DESCRIPCIÓN
Herbicida que actúa inhibiendo la síntesis de glutamina en las plantas, causando una rápida desecación de tejidos verdes.

MODO DE ACCIÓN
Herbicida de contacto.

FORMA DE PREPARACIÓN
Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol, lentes de seguridad, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla con respirador. Para abrir el envase, retire el sello de seguridad, abra el frasco y utilice. Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia. En forma separada prepare una pre-mezcla con poca agua y la dosis a emplear de **Viatetek FUEGOTEK 200**. Una vez que el líquido se diluya por completo, vierta esta pre-mezcla al tanque y complete con agua sin dejar de agitar. Use el equipo de protección como lo indica la sección de “Precauciones y Advertencias de Uso” de esta etiqueta.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
Excelente control de emergencia, actúa rápidamente incluso bajo condiciones adversas, con baja toxicidad hacia la fauna beneciosa.

CULTIVOS RECOMENDADOS
Maíz, sorgo, cidro, lima, limón, mandarina, naranja, pomelo, tangerino, toronja, aguacatero, agave, manzano, membrillo, peral, tejocote, caña de azúcar, mango, plátano, pepino, melón, calabaza, calabacita, sandía, chayote, frijol ejotero, frijol y soya.

DOSIS
0.7 - 3.5 L/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

Vitatek
Contacto@vitatek.com.mx

Titular de la marca y distribuidor:
Avenida Santa Fe 596, Int. 1602 Lomas de Santa Fe,
Cuajimalpa de Morelos CDMX, C.P. 05348

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	OBSERVACIONES
Maíz, Sorgo (SL)	Coquillo (Cyperus rotundus) Lechosa (Euphorbia heterophyla) Flor Amarilla (Baltimora recta) Tomatillo (Physalis angulata) Zacate de agua (Echinochloa colonum)	1.125 – 1.5	Realizar una aplicación foliar en postemergencia dirigida a la maleza, cuando ésta se encuentra en crecimiento activo no mayor a 15 cm de altura, volumen de aplicación 150-250 L/ha.
Cidro, Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Pomelo, Tangerino, Toronja (SL)	Platanillo (Heliconia schiedeana) Guinar (Sida rhombifolia) Quintonil (Amaranthus hybridus) Campanilla (Ipomoea purpurea) Pata de gallo (Eleusine indica) Caminadora (Rottboellia cochinchinensis)	2.5 – 3.0	Realizar una aplicación al follaje en postemergencia dirigida a la maleza cuando ésta tenga una altura menor a 15 cm; volumen de aplicación sugerido 196 – 296 L de mezcla/ha.
Aguacatero (SL)	Alache (Anoda cristata) Lentejilla (Lepidium virginicum) Ojo de perico (Melampodium perfoliatum) Confitillo (Parthenium bipinnatifidum) Zacate cola de zorra (Eragrostis mexicana) Zacate bahía (Paspalum notatum) Lengua de vaca (Rumex mexicana) Trébol (Trifolium repens)	1.5 – 2.0	Realizar una aplicación al follaje en postemergencia dirigida a la maleza cuando ésta tenga una altura menor a 15 cm; volumen de aplicación sugerido 220 – 320 L de agua/ha.
Agave (No aplicar en plantaciones mayores a 5 años)	Quintonil (Amaranthus hybridus) Pata de gallo (Eleusine indica) Platanillo (Heliconia schiedeana) Campanilla (Ipomoea purpurea) Escobilla (Sida rhombifolia) Caminadora (Rottboellia cochinchinensis)	2.0 – 2.5	Realizar una aplicación al follaje en postemergencia dirigida a la maleza cuando ésta tenga una altura menor a 15 cm; volumen de aplicación sugerido 210 – 310 L de mezcla/ha.
Manzano, Membrillo, Peral, Tejocote (SL)	Coquillo (Cyperus esculentus) Lechugilla(Sonchus oleraceus) Quelite (Amaranthus hybridus) Quelite cenizo (Chenopodium album) Zacate grama (Cynodon dactylon) Zacate cola de zorra (Chloris virgata) Nabo silvestre (Brassica rapa)	2.1-2.8	Realizar una aplicación foliar en postemergencia temprana dirigida a la maleza cuando ésta tenga una altura de menos de 15 cm; volumen de aplicación sugerido 200 – 300 L de agua/ha.
Caña de azúcar (SL)	Caminadora (Rottboellia cochinchinensis) Zacate casamiento (Eragrostis mexicana) Malva cimarrona (Anoda cristata) Verdolaga (Portulaca oleracea) Zacate Johnson (Sorghum halepense) Rosa amarilla (Melampodium divaricatum) Quiebra plato (Ipomoea purpurea)	1.68-2.80	Realizar una aplicación foliar en postemergencia temprana dirigida a la maleza cuando ésta tenga una altura de menos de 15 cm; volumen de aplicación sugerido 200 – 300 L de agua/ha.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	OBSERVACIONES
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote (SL)	Arrocillo (Echinochloa colonum) Zacate casamiento (Eragrostis mexicana) Tomatillo (Physalis floridana) Verdolaga (Portulaca oleracea) Zacate cadillo (Cenchrus echinatus) Correhuela (Convolvulus arvensis) Quelite (Amaranthus hybridus)	1.4-2.8	Realizar una aplicación foliar dirigida a la maleza en pre-siembra al cultivo y postemergencia temprana a la maleza cuando ésta tenga menos de 15 cm de altura; volumen de aplicación sugerido 300 L de agua/ha.
Mango (SL)	Zacate johnson (Sorghum halepense) Escobilla (Sida rhombifolia) Pasto amargo (Paspalum conjugatum) Quelite (Amaranthus hybridus) Alambrillo (Polygonum aviculare) Lengua de vaca (Rumex crispus)	2.1-3.5	Realizar una aplicación foliar total, en postemergencia temprana dirigida a la maleza cuando ésta tenga una altura menor a 15 cm; volumen de aplicación sugerido 200 – 300 L de agua/ha.
Plátano (SL)	Guinea grass (Panicum maximum) Quelite red (Amaranthus retroflexus) Clover (Melilotus alba) Milky (Euphorbia heterophylla) Higuerilla (Ricinus communis) Acahual (Simsia amplexicaulis) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.1-2.8	Realizar una aplicación foliar total, en postemergencia temprana dirigida a la maleza cuando ésta tenga una altura menor a 15 cm; volumen de aplicación sugerido 250 – 350 L de agua/ha.
Frijol ejotero, Frijol, Soya. (SL)	Zacate cadillo (Cenchrus echinatus) Verdolaga (Portulaca oleracea) Zacate pitillo (Ixophorus unisetus) Zacate Johnson (Sorghum halepense) Quelite (Amaranthus hybridus) Zacate conejo (Digitaria ciliaris)	0.7-2.1	Realizar una aplicación foliar dirigida a la maleza en pre-siembra al cultivo y postemergencia temprana a la maleza cuando ésta tenga menos 15 cm de altura; volumen de aplicación sugerido 300 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas.
( ) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** Sin Límite

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en cultivos sensibles o durante condiciones extremas de calor o sequía.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Usar equipo de protección personal, evitar aplicaciones en días ventosos para minimizar la deriva.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Administre oxígeno si el paciente tiene dicultades para respirar. En caso de contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. En caso de contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón durante por lo menos 5 minutos. Retire la ropa contaminada y los zapatos. Lave la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. En caso de ingestión: Si la persona está consciente y alerta, puede inducir el vómito. Si está inconsciente, no administre nada por la boca y busque atención médica de inmediato.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por vía ocular: Puede ocasionar ligera irritación en los ojos como conjuntivitis, puede provocar lesiones oculares graves. Por vía dérmica: Puede ocasionar irritación cutánea y enrojecimiento. Por vía inhalatoria: Irritación en el tracto respiratorio, puede provocar insuficiencia respiratoria, brinde atención médica inmediata. Por vía oral: Su ingestión puede provocar vómito, diarrea, dolor abdominal y náuseas.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: El tratamiento debe ser sintomático, no tiene antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe ser directamente al control de síntomas y condición clínica. Controlar la temperatura.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX) A través del número 800 000 2869 (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL MATERIAL DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (PLANTAS VASCULARES) Y ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES ACUATICOS (PECES).

GARANTÍA VITATEK, S.A. DE C.V.

Garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **VITATEK S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.

Vitatek

Contacto@vitatek.com.mx

Titular de la marca y distribuidor:
Avenida Santa Fe 596, Int. 1602 Lomas de Santa Fe,
Cuajimalpa de Morelos CDMX, C.P. 05348