

H

Condraz®

Tritosulfurón + Dicamba
Herbicida / Gránulos dispersables en agua

“USO AGRÍCOLA”

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:

% EN PESO

Tritosulfurón: N-[[4-metoxi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-3-carbamoyl]-2-(trifluorometil)bencen-1-sulfonamida.....	25.00%
(Equivalente a 250 g de i.a./kg)	
Dicamba: ácido 3,6-dicloro-o-anisico	50.00%
(Equivalente a 500 g de i.a./kg)	

INGREDIENTES INERTES:

Antiespumante y dispersantes	25.00%
Total	100.0%

REGISTRO SANITARIO No.: RSCO-MEZC-HEDE-1225-X0011-420-075



Recuerde seguir las recomendaciones que vienen en la etiqueta del producto, así como el uso de equipo de protección personal completo, limpio y en buen estado durante el manejo y la aplicación de los productos de protección de cultivos.

PRESENTACIONES DISPONIBLES:

CULTIVO	PRESENTACIÓN
Diversos	CONDRAZ®, 0.2 KG, MX
Diversos	CONDRAZ®, 1 KG, MX

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El propósito de este documento tiene un carácter únicamente informativo, por lo cual no sustituye ningún etiquetado o Registro Sanitario autorizados. Así mismo, esta información se presenta con la finalidad de proporcionar recomendaciones que podrá seguir para un uso y manejo correcto del producto en cuestión, sin embargo, usted entiende que el uso y manejo que pueda dar al producto es su responsabilidad y deberá ser realizado conforme al etiquetado.

En caso de requerir mayores detalles sobre esta solución o cualquier otra de nuestras soluciones para la protección de sus cultivos, consulte la etiqueta autorizada y/o acceda a la información proporcionada en nuestra página: www.agriculture.basf.com/mx/es.



“INSTRUCCIONES DE USO”
 “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Condraz® es un herbicida sistémico de post-emergencia especialmente indicado para el control de malezas de hoja ancha en el cultivo de maíz, trigo y cebada.

Condraz® está formulado en base a dos ingredientes activos; Tritosulfurón (es absorbido principalmente por las hojas de las plantas) y Dicamba (es absorbido por las hojas y raíces, siendo estos translocados en ambos sentidos en la planta). Tritosulfurón inhibe la síntesis de aminoácidos a través de la enzima acetolactato sintetasa y Dicamba afecta el nivel de auxinas en la planta, entonces las malezas dejan de crecer, muriendo posteriormente.

La mezcla de estos dos ingredientes activos amplía el espectro de control de maleza de hoja ancha en maíz, trigo y cebada.

Cultivo	Maleza	Dosis (g/ha)	Época de Aplicación
Maíz (37)	Confitillo <i>Parthenium bipinnatifidum</i> Correhuela <i>Ipomoea purpurea</i> Escobilla <i>Sida rhombifolia</i> Gigantón <i>Tithonia tubaeformis</i>	130-180	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza. Volumen de aplicación de 500–600 L de agua/ha. Realizar la aplicación durante la etapa vegetativa, como máximo en la sexta hoja verdadera del cultivo.
	Higuerilla <i>Ricinus communis</i>	150-180	
Avena, Arroz, Cebada, Centeno, Trigo (37)	Malva <i>Malva parviflora</i> Chual rojo <i>Chenopodium murale</i> Cenizo <i>Chenopodium album</i> Quelite <i>Amaranthus spp.</i>	150-175	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza; agregar a la mezcla un coadyuvante no iónico a razón de 30 mL/L de agua. Volumen de aplicación de 150–250 L de agua/ha.
Maíz, Trigo (37)	Croton lobado <i>Croton lobatus</i> Sanguinaria <i>Polygonum aviculare</i> Dormilona <i>Mimosa pudica</i> Amor seco <i>Bidens pilosa</i> Clavel del pozo <i>Eclipta prostrata</i> Estrellita <i>Galinsoga parviflora</i>	150-350	Realizar una aplicación foliar dirigida a la maleza cuando esté en crecimiento activo (menor a 10 cm); volumen de aplicación sugerido de 200–400 L de agua/ha.


() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
 SL: Sin límite.
Tiempo de reentrada a los lugares tratados: Una vez que el producto haya secado.
Número máximo de aplicaciones por ciclo: 1.



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

El envase del producto debe abrirse girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, retire con cuidado el sello de seguridad y vierta el producto hacia el interior del tanque de aplicación. Durante la preparación y aplicación, siempre utilice el equipo de protección personal señalado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO".

Disolver la dosis recomendada de **Condraz®** en un poco de agua y luego adicionarlo al tanque del equipo pulverizador a medio llenar y completar hasta volumen total con agitación. Adicionar el coadyuvante de su preferencia, como último producto de la mezcla a razón de 30 mL/L.



MANEJO DE RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL."

El producto herbicida **Condraz®** está compuesto por Tritosulfurón y Dicamba, los cuales están clasificados de acuerdo a su Modo de Acción (MdA): Inhibición de la acetolactato sintetasa e Imitadores de auxinas, en los grupos 2 y 1, respectivamente, de acuerdo a la clasificación internacional HRAC. Es recomendable rotar el uso de **Condraz®** con herbicidas de grupos de diferente MdA a los grupos 2 y 1 para evitar exponer generaciones consecutivas de enfermedad al mismo MdA. Se deben usar y respetar las dosis, número máximo de aplicaciones por ciclo, intervalos de aplicación y días a cosecha recomendados en la etiqueta. No seguir estas indicaciones puede poner en riesgo el control, incrementar el riesgo de resistencia de las malezas al producto y comprometer el límite máximo de residuos autorizados.

GRUPO	2	1	HERBICIDA
-------	---	---	-----------

Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com